



ఏఎల్ఎల్: కొనసాగింపు చికిత్స మాత్రలు, జ్వరం వస్తే ఏం చేయాలి

ALL: maintenance tablets, and what to do about fever

తెలుగు

ENGLISH

కొనసాగింపు చికిత్స అంటే

తీవ్రమైన చికిత్స దశలు పూర్తయ్యాక, ఇంట్లో వేసుకునే మాత్రలతో చికిత్స రెండు నుంచి మూడేళ్లు కొనసాగుతుంది.

లుకేమియా తిరిగి రాకుండా కాపాడే ముఖ్యమైన దశ ఇది — రక్త పరీక్షలు మామూలుగా ఉన్నా, ఆరోగ్యంగా అనిపించినా మాత్రలు ఆపకండి.

సాధారణంగా రోజూ వేసుకునే మాత్ర (6-ఎంపీ), వారానికి ఒక్కసారి వేసుకునే మాత్ర (మెథోట్రెక్సేట్) ఉంటాయి; మధ్యమధ్యలో ఇంజక్షన్, స్టెరాయిడ్ మాత్రలు ఇస్తారు.

వారానికి ఒక్కసారి వేసుకోవాల్సిన మాత్రను పొరపాటున రోజూ వేసుకోకండి — క్యాలెండర్‌పై ఆ రోజును గుర్తు పెట్టుకోండి.

What maintenance treatment is

After the intensive phases, treatment continues at home with tablets for two to three years.

This phase keeps the leukaemia from coming back: do not stop the tablets even if the blood counts are normal and you feel well.

Usually there is a daily tablet (6-MP) and a once-a-week tablet (methotrexate), with an injection and steroid tablets from time to time.

Never take the once-a-week tablet every day by mistake: mark its day on a calendar.

మాత్రలు సరిగ్గా వేసుకోవడం

వైద్యులు చెప్పిన మోతాదే వేసుకోండి; రక్త పరీక్షల ఫలితాలను బట్టి మోతాదు మారుతూ ఉంటుంది.

రక్త కణాల లెక్క, కాలేయ పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోండి.

మాత్ర తప్పిపోతే మరుసటి రోజు రెండు వేసుకోకండి; ఏం చేయాలో వైద్యులను అడగండి.

ఏ కొత్త మందునా — నొప్పి మాత్రలు, యాంటీబయాటిక్‌లు, మూలికా మందులు — వైద్యులను అడిగాకే వేసుకోండి.

మధ్యలో మానేయడం, ఆలస్యం చేయడం జబ్బు తిరిగి రావడానికి ముఖ్య కారణం; ఖర్చు లేదా ప్రయాణం కష్టమైతే మాతో మాట్లాడండి.

Taking the tablets correctly

Take only the amount the doctor tells you; it changes with your blood test results.

Have your blood count and liver tests regularly.

If you miss a tablet, do not take two the next day; ask the doctor what to do.

Check with the doctor before any new medicine, including painkillers, antibiotics and herbal medicines.

Stopping or delaying treatment is a major reason the leukaemia returns; if cost or travel is hard, talk to us.

జ్వరం వస్తే

38 డిగ్రీల సెల్సియస్ (100.4 డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్) లేదా ఎక్కువ జ్వరం, చలి, వణుకు వస్తే అదే రోజు — రాత్రినా సరే — ఆసుపత్రికి రండి.

తెల్ల కణాలు తక్కువగా ఉంటే జ్వరం ప్రమాదకరం; రక్త పరీక్ష చేసి వెంటనే యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాలి.

ఉపిరితిత్తుల ఇన్ ఫెక్షన్ రాకుండా ఇచ్చే మాత్రలను క్రమం తప్పకుండా వేసుకోండి; దగ్గు, ఆయాసం వస్తే వెంటనే చెప్పండి.

ఆటలమ్మ (చికెన్ పాక్స్) లేదా తట్టు ఉన్నవారి దగ్గరికి వెళ్తే వెంటనే చెప్పండి.

If you get a fever

A temperature of 38°C (100.4°F) or more, chills or shivering: come to hospital the same day, even at night.

With low white cells a fever is dangerous: a blood test and antibiotics are needed at once.

Take the tablets that prevent a lung infection regularly; report a cough or breathlessness at once.

Tell us at once if you have been near someone with chickenpox or measles.

ఇవి కూడా వెంటనే చెప్పండి

కళ్లు పచ్చబడడం, ముదురు రంగు మూత్రం

కమిలిన మచ్చలు, రక్తస్రావం, బాగా పాలిపోవడం

నోట్లో పుండ్ల వల్ల తినలేకపోవడం

కాళ్లు చేతుల్లో తిమ్మిర్లు, తీవ్రమైన మలబద్ధకం, కడుపు నొప్పి

Also report at once

Yellow eyes or dark urine

Bruises, bleeding or marked pallor

Mouth ulcers that stop you eating

Tingling in the hands or feet, severe constipation or tummy pain

రోజువారీ జీవితం

వైద్యులు చెప్పినట్లు బడికి, పనికి వెళ్లడం, తేలికపాటి వ్యాయామం సాధారణంగా కొనసాగించవచ్చు.

చేతులు తరచుగా కడుక్కోండి; జలుబు, జ్వరం ఉన్నవారికి దూరంగా ఉండండి.

చికిత్స సమయంలో ప్రాణమున్న (బలహీనపరచిన) క్రిములతో చేసే టీకాలు వేయించుకోకూడదు; మీకూ, ఇంట్లో అందరికీ ఏటా పూ టీకా వేయించండి.

Daily life

School, work and light exercise can usually continue, as the team advises.

Wash your hands often; keep away from people with colds or fever.

No live vaccines during treatment; a yearly flu vaccine for you and everyone at home.

సారాంశం: కొనసాగింపు చికిత్స రెండు మూడేళ్లు ఇంట్లోనే — మాత్రలు ఆపకుండా, చెప్పిన మోతాదులోనే వేసుకోండి; వారానికి ఒక్కసారి వేసుకునే మాత్రను రోజూ వేసుకోకండి. 38 డిగ్రీల జ్వరం, చలి, వణుకు వస్తే అదే రోజు ఆసుపత్రికి రండి. ఖర్చు, ప్రయాణం కష్టమైతే చెప్పండి — మధ్యలో మానేయడమే పెద్ద ప్రమాదం.

In short: Maintenance lasts two to three years at home: take the tablets without gaps and only in the amount prescribed; never take the weekly tablet daily. A temperature of 38°C, chills or shivering: come to hospital the same day. If cost or travel is hard, tell us: stopping halfway is the biggest risk.

డాక్టర్ హరిత చిరమన · Dr. Haritha Chiramana, MD, DM

C.R. Reddy Cancer Center, C.R. Reddy Superspeciality Hospital, Leela Mahal Road, Nellore · 0861 232

5344 · WhatsApp +91 79896 42272

ఈ కరపత్రం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే; మీ వైద్యుల సలహాకు బదులు కాదు.

For general awareness only; it does not replace your doctor's advice.



drharitha.co.in/handouts/al
l-maintenance-tablets-
and-fever-telugu