



పిల్లలు, యువతలో ఎముక నొప్పి: ఎప్పుడు ఎక్స్-రే చేయించాలి?

Bone pain in children and teenagers: when to get an X-ray

తెలుగు

ENGLISH

ఈ లక్షణాలు ఉంటే వైద్యులను కలిసి ఎక్స్-రే చేయించండి

కొన్ని వారాలుగా తగ్గని ఎముక లేదా కీలు నొప్పి

See a doctor and get an X-ray if there is

Bone or joint pain that has not settled for several weeks

రాత్రి నిద్రలో నుంచి లేపే నొప్పి, లేదా విశ్రాంతి తీసుకున్నా తగ్గని నొప్పి

Pain that wakes the child at night, or does not settle with rest

నొప్పి ఉన్న చోట గట్టి వాపు, లేదా కాలు ఈడ్చుకుంటూ కుంటుతూ నడవడం

A firm swelling at the painful spot, or limping

మోకాలు లేదా భుజం చుట్టూ నొప్పి — ఆటల్లో దెబ్బ తగిలినదని అనుకుంటున్నా సరే

Pain around the knee or shoulder, even if it is blamed on a knock during play

చిన్న దెబ్బకే ఎముక విరగడం

A bone that breaks after a minor knock

నడుము నొప్పితో పాటు కాళ్లలో బలం తగ్గడం, లేదా మూత్రం, మలం అదుపు తప్పడం — వెంటనే ఆసుపత్రికి రండి

Back pain with weak legs, or loss of control of urine or stool: come to hospital at once

ఈ పొరపాట్లు చేయకండి

రాత్రి నిద్ర లేపే లేదా వారాల తరబడి ఉండే నొప్పిని “ఎదుగుదల నొప్పులు” అని వదిలేయకండి.

Please avoid these mistakes

Do not dismiss pain that wakes the child at night or lasts for weeks as “growing pains”.

మొదటి ఎక్స్-రే బాగానే ఉన్నా నొప్పి కొనసాగితే, ఎం.ఆర్.ఐ. స్కాన్ అవసరం కావచ్చు.

If the first X-ray looks normal but the pain continues, an MRI scan may be needed.

ఎముక వాపును చీము పట్టడం లేదా క్షయ అని ముక్క పరీక్ష లేకుండా నిర్ణయించకండి; క్షయ మందులను ఊరికే మొదలుపెట్టకండి.

Do not decide that a bone swelling is infection or TB without a tissue test, and do not start TB medicines without proof.

స్కాన్లు, ముక్క పరీక్ష చేయకముందే ఎముకను గీకి శుభ్రం చేసి శస్త్రచికిత్స చేయించకండి.

Do not have the bone scraped out in an operation before scans and a biopsy are done.

తర్వాత ఏం జరుగుతుంది?

మొదట ఎముక మొత్తానికి ఎక్స్-రే; తర్వాత ఎం.ఆర్.ఐ.; ఊపిరితిత్తులకు సీటీ స్కాన్.

ముక్క పరీక్షను శస్త్రచికిత్స చేసే ఆసుపత్రిలోనే, లేదా వారితో కలిసి ప్లాన్ చేసి చేయాలి.

ఎముక క్యాన్సర్లకు శస్త్రచికిత్సకు ముందు, తర్వాత క్యాన్సర్ మందుల చికిత్స ఇస్తారు; చాలామందిలో కాలు లేదా చేయి తీయకుండా కాపాడవచ్చు.

మందులు మొదలుపెట్టే ముందు, అబ్బాయిలకు వీర్యం భద్రపరచడం, అమ్మాయిలకు అండాశయ రక్షణ గురించి వైద్యులతో మాట్లాడండి.

What happens next?

First an X-ray of the whole bone, then an MRI, and a CT scan of the lungs.

The biopsy should be done at the hospital that will operate, or planned together with it.

Cancer medicines are given before and after the operation for bone cancers; in most patients the limb can be saved.

Before the medicines start, talk to the doctors about storing sperm for boys and protecting the ovaries for girls.

గుర్తుంచుకోండి

పిల్లల్లో ఎముక క్యాన్సర్ అరుదు; కానీ తొందరగా గుర్తిస్తే చికిత్స తేలికవుతుంది.

ఆటల్లో దెబ్బ ఎముక క్యాన్సర్ కు కారణం కాదు; దెబ్బ వల్ల అప్పటికే ఉన్న గడ్డ బయటపడుతుంది.

ముక్క పరీక్ష వల్ల క్యాన్సర్ వ్యాపించదు.

చికిత్స తర్వాత చాలామంది పిల్లలు నడుస్తారు, పరుగెత్తుతారు, ఆడుకుంటారు.

Remember

Bone cancer is rare in children, but treatment is easier when it is found early.

A knock during play does not cause bone cancer; it may only draw attention to a tumour that was already there.

A biopsy does not spread cancer.

After treatment, many children walk, run and play.

సారాంశం: కొన్ని వారాలుగా తగ్గని, రాత్రి నిద్ర లేపే ఎముక నొప్పి, వాపు లేదా కుంటడం ఉంటే ఎక్స్-రే చేయించండి. "ఎదుగుదల నొప్పులు" అని వదిలేయకండి. ముక్క పరీక్ష చేయకుండా క్షయ మందులు మొదలుపెట్టకండి, ఎముకను గీయించకండి.

In short: Bone pain that lasts for weeks or wakes the child at night, with a swelling or limp, needs an X-ray. Do not dismiss it as growing pains. Do not start TB medicines or have the bone scraped before a biopsy.

డాక్టర్ హరిత చిరమన · Dr. Haritha Chiramana, MD, DM

C.R. Reddy Cancer Center, C.R. Reddy Superspeciality Hospital, Leela Mahal Road, Nellore · 0861 232 5344 · WhatsApp +91 79896 42272

ఈ కరపత్రం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే; మీ వైద్యుల సలహాకు బదులు కాదు.

For general awareness only; it does not replace your doctor's advice.



drharitha.co.in/handouts/bone-pain-children-teenagers-telugu